

## ¿Sabías que...?

1. El cáncer de cuello uterino es causado por el virus del papiloma humano (VPH).
2. El contagio del VPH es por relaciones sexuales.
3. Existen más de 100 tipos (genotipos) de VPH; solo 14 son los que causan cáncer. Los más peligrosos son el VPH16 y el VPH 18.
4. Al inicio del contagio del VPH no se presentan signos, ni síntomas.
5. Algunos tipos de VPH pueden causar verrugas, pero estas no son causantes de cáncer.
6. El VPH se puede eliminar naturalmente, pero es necesario realizar evaluaciones permanentes y periódicas.
7. La forma más moderna de detectar el VPH es mediante la obtención de células para realizar la prueba del VPH y la prueba de citología en base líquida (cotest).
8. La prueba de VPH/PCR COBAS detecta los VPH que producen cáncer aun cuando no se inicie la etapa de precáncer.
9. La prueba de citología en base líquida permite detectar las células enfermas, mejor aún que el Papanicolaou.
10. La prueba de VPH/PCR COBAS y la de citología en base líquida (cotest) se realizan con una sola toma de muestra, de manera sencilla, rápida y no dolorosa.
11. La prueba de VPH/PCR COBAS y la de citología en base líquida (cotest) se procesan con tecnología avanzada en Estados Unidos; los resultados del cotest se reportan en 14 días, por correo electrónico.

### **Charla: Cáncer de cuello uterino**

Dr. Manuel Álvarez Larraondo

Médico, gerente general de Onco Prev Internacional - Servicios Oncológicos

Viernes 26 de agosto, 12.00 horas

Universidad de Lima, Aula Magna B

Ingreso libre